

# КОРЬ

**Острая инфекционная болезнь, вызываемая фильтрующимся вирусом и характеризующаяся воспалением слизистых оболочек дыхательных путей, полости рта и глаз, появлением сыпи.**



Передается воздушно-капельным путем от больного корью. Корь считается заразной 5 дней до и 5 дней после высыпания, осложненная корь заразна 10 дней после высыпания. К кори восприимчивы люди всех возрастов, кроме детей до 3-х месяцев. После перенесенной болезни остается стойкий иммунитет.



Инкубационный период 8-17 дней. Симптомы - насморк, кашель, конъюнктивит. Появляются изменения на слизистой оболочке рта и зева. На слизистой оболочке щек против коренных зубов появляются белесоватые точки, окруженные красным ободком. Другим ранним признаком кори является пятнистая ангина.



Затем наступает период высыпания, сопровождающийся ухудшением общего состояния и усилением катара слизистых оболочек. Сыпь появляется на лице и за ушами, на 2-й день переходит на туловище и на 3-й день покрывает конечности.



У больных могут возникнуть осложнения: ларингит и бронхит. Иногда ларингит приобретает тяжелое течение, сопровождаясь отеком, затруднением дыхания, нарушением звучности голоса. Это коревой круп. Наиболее тяжелое осложнение - пневмония. Нередки осложнения со стороны пищеварительного тракта, стоматиты, расстройства кишечника (поносы). В ранние периоды кори возможны катаральный и гнойный отиты.



Корь, даже если протекает без осложнений, вызывает глубокие изменения в организме и повышает восприимчивость к вторичным инфекциям (дифтерия, дизентерия, стрептококковые заболевания и т.п.).

**ПРИВИВКИ ПРОТИВ КОРИ ПОМОГАЮТ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ !**



# КОРЬ

**Корь** – вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью. Вирус может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов – одновременно заболевают дети, проживающие на разных этажах дома.

Период от контакта с больным корью и до появления первых признаков болезни длится от 7 до 14 дней.

Заболевание начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения температуры до 40 градусов С. Чуть позднее к этим симптомам присоединяются насморк, кашель и практически полное отсутствие аппетита.

Очень характерно для кори появление конъюнктивита – воспаления слизистой оболочки глаз, которое проявляется светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, а в последующем – появлением гнойного отделяемого. Эти симптомы продолжаются от 2 до 4 дней.

**На 4 день заболевания появляется сыпь**, которая выглядит, как мелкие красные пятнышки различных размеров (от 1 до 3 мм в диаметре), со склонностью к слиянию. Сыпь возникает на лице и голове (особенно характерно появление ее за ушами) и распространяется по всему телу на протяжении 3 - 4 дней. Для кори очень характерно то, что сыпь оставляет после себя пигментацию (темные пятнышки, сохраняющиеся нескольких дней), которая исчезает в той же последовательности, как появляется сыпь.

**При заболевании корью могут возникать довольно серьезные осложнения.** В их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение как энцефалит (воспаление мозга).

Необходимо помнить о том, что после перенесенной кори на протяжении достаточно продолжительного периода времени (до 2-х месяцев) отмечается угнетение иммунитета, поэтому ребенок может заболеть каким-либо простудным или вирусным заболеванием, поэтому нужно оберегать его от чрезмерных нагрузок, по возможности – от контакта с больными детьми.

После кори развивается стойкий пожизненный иммунитет. Все переболевшие корью становятся невосприимчивы к этой инфекции.

**Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация против кори, которая включена в Национальный календарь прививок.**